

什么是过敏性紫癜

什么是过敏性紫癜?

又称 Henoch-Schonlein 紫癜, 是一种侵犯皮肤和其他器官细小动脉和毛细血管的过敏性血管炎, 常伴有关节痛和肾损害, 但血小板不减少。有人认为过敏性紫癜与变异性皮肤血管炎属于同一个谱系疾病。

引起过敏性紫癜的原因

感染: 1. 细菌和病毒感染, 这是最常见原因, 约占 20%。2. 寄生虫感染, 约占 30%。

食物: 主要是动物异种蛋白一起的机体过敏所致, 主要有鱼、虾、蟹、牛奶、鸡蛋等。

药物: 常见的抗生素(青霉素、氯霉素、链霉素、红霉素、磺胺类)、解热镇痛药(水杨酸类、氨基比林、保泰松)、镇静剂(苯巴比妥、水合氯醛、甲丙氨酯、三氟拉嗪)、激素类(人工合成雌激素、丙酸睾酮、胰岛素)、抗结核药(对氨基水杨酸钠、异烟肼), 其他譬如洋地黄制剂、奎尼丁、麻黄碱、阿托品、氯噻嗪、乙内酰脲、甲苯磺丁脲、丙硫氧嘧啶、奎宁、碘化物, 以及金、砷、铋、汞等。由药物引起的约占 3.36%。

其他诱发因素: 寒冷、外伤、昆虫叮咬、花粉、种痘、结核菌素试验、预防接种。寒冷引起本病可能属于抗原-抗体复合物反应。

过敏性紫癜的临床表现

1. 好发于儿童及青少年, 开始可有发热、头痛、全身不适等。皮肤表现为针头至黄豆大小瘀点、瘀斑或荨麻疹样皮疹, 严重者可发生水泡、血疱, 甚至溃疡。好发于四肢身侧, 尤其是双下肢和臀部。皮损对称分布, 成批出现容易复发。

2. 仅有皮肤损害者称单纯性紫癜。

3. 伴有腹痛、腹泻、便血, 甚至胃肠道出血者称为胃肠型紫癜。

4. 伴有关节肿胀、疼痛、甚至关节积液者称为关节型紫癜。

5. 伴血尿、蛋白尿, 肾损害者称为肾型紫癜。

过敏性紫癜如何治疗?

1. 病因治疗: 积极寻找、治疗可能的病因。

2. 药物治疗: 抗生素有感染因素者可选用适当的抗生素; 抗组胺药适用于单纯型紫癜, 可同时使用芦丁维生素 C、钙剂、安络血或止血敏等; 氢苯砒早期选用有效; 糖皮质激素适用于严重皮肤损害或关节型、腹型、肾型紫癜; 免疫抑制剂顽固的慢性肾炎患者, 可选用环孢素 A 或者异力抗(他可莫司胶囊)可与糖皮质激素联合应用; 对症治疗发热、关节痛者可使用解热镇痛药如吲哚美辛, 芬必得。

3. 脱敏治疗: 对于小儿患者, 可考虑特异性脱敏治疗。

4. 血浆置换: 该法能有效清除血循环中的免疫复合物, 从而防止血管阻塞和梗死。适用于血浆中存在大量免疫复合物的腹型、肾型患者。

王丹

专家简介



刘瑜, 市中医院血液病科副主任, 主任医师。现任市血液病研究所副所长, 省中医血液病专业委员会委员, 省免疫学会委员, 市中医药学会会员等, 市中西医结合血液学会副主席。从事成人及儿童血液病临床、治疗与预防 20 余年, 积累了丰富的临床经验。对白血病、淋巴瘤、再生障碍性贫血、血小板减少症、溶血性贫血、难治性贫血、骨髓纤维化、不明原因的发热、肝脾肿大等疾病的诊断和治疗有深厚造诣, 并擅长骨髓细胞形态学的诊断与健康指导。



传播华夏五千年优秀文化

中医中药


本栏目上版电话: 13663958567 13839593178



贾长明, 出生于中医世家, 2012 年, 被漯河市卫生局授予“民间知名中医”称号, 行医 40 年

擅长: 子宫腺肌症、子宫异位症、月经不调、顽固性痛经、子宫肌瘤、多发性子宫及卵巢囊肿、久婚不育、输卵管粘连、卵泡发育不良及孕后滑台等各种妇科疑难杂症。

咨询电话: 13839502229



柴森, 1947 年生, 2008 年, 当选河南省中西医结合烧伤专业委员会委员; 2012 年, 被漯河市卫生局授予“民间知名中医”称号

擅长: 外科——烧烫伤、电烧伤、化学烧伤、烧伤溃疡、疤痕、瘙痒及溃疡面长期不愈等疾病。

内科——浅表性胃炎、糜烂性胃炎、萎缩性胃炎、胃食管反流性胃炎及结肠炎和溃疡性结肠炎等疾病。

咨询电话: 13939537099

喜讯: 日前, 漯河市中医院血液病科, 与国内最具权威的血液病诊疗机构——中国医学科学院天津血液病研究所天津血液病医院合作, 为漯河周边地区的患者带来福音。患者在漯河市中医院血液病科就诊, 由天津血液病研究所出具诊断和治疗方案, 整个诊疗过程均由天津血液病研究所专家全程指导。患者足不出市即可享受到国内最具权威的血液病淋巴瘤方面专家提供的最佳治疗方案, 省去了患者到大医院看病难、看病贵、路途奔波的麻烦, 并可节约高额的诊疗费用。

漯河市中医院血液病科

天津血液病研究所技术协作单位

健康热线: 2166771

健康知识

子宫腺肌病的临床表现

子宫腺肌病的临床表现主要为: 痛经伴进行性加重, 月经异常、不孕、性交痛、盆腔痛、低热、白带增多和经期疼痛等不适症状, 痛经所产生的原因可能为异位内膜随卵巢改变出血而产生病灶外局部压力增高, 周围平滑肌组织受到刺激而发生痉挛收缩而产生疼痛。

妇科检查常可发现子宫增大, 并且月经期或月经前后子宫增大, 以后逐渐变小的特点。但不超过妊娠 3 个月大小, 如大于 3 个月则往往提示有并发症。

据浙江大学医学院附属妇产科医院 206 例子宫腺肌症, 子宫增大 188 例, 痛经 110 例, 月经过多或月经紊乱 143 例。188 例子宫增大的患者中, 172 例子宫小于 3 个月孕大小, 单纯子宫腺肌症无一例超过 3 个月孕, 而子宫增大超

过孕 3 个月的 16 例, 均合并有子宫肌瘤。

至于月经过多原因虽从传统观点认为子宫体积增大, 内膜面积增多可增加出血机会, 但目前从临床观察腺肌症的子宫常小于妊娠 3 个月大小。

子宫腺肌病也会导致不育, 这方面资料早有报道, Lavilis 提出该病与生育, 流产及剖腹产史有关, 腺肌症主要发生在 40~50 岁妇女中, 近几年随着宫腔操作技术的广泛, 有些年轻妇女也有发病在 16~30 岁的妇女中, 而且生育年龄的妇女也可导致不育的发生。有文献报道, 分析 26 例有生育要求的腺肌症妇女其中不育及习惯流产共 20 例, 占手术病人的 76.9%, 可见不育在腺肌病者的地位不容忽视。

贾长明



种植牙安全吗

种植牙是目前修复牙齿缺失最适合的方法, 它修复牙齿只需要在缺失牙齿的牙槽上修复, 不会对邻牙造成伤害, 具有感觉自然、不损伤邻牙、坚固、使用方便、没有痛苦等优势。

种植牙手术采用局部麻醉, 创伤小、风险小, 手术后即可吃软食, 几乎无痛苦。

感觉自然。种植完成后牙齿感觉跟天然牙一样。

不损伤邻牙。种植牙有自己的牙根, 因此无须研磨患者牙齿以进行固定牙齿, 无须切磨邻近的天然牙齿。

坚固的种植牙。因为是植入在牙槽骨上, 所以种植牙较为坚固稳定, 这一优点在进食和说话时尤其突出。

使用方便。种植牙因义齿基托小, 无基托与卡环等结构, 因此美观舒适, 无异物感, 对发音影响小, 患者使用起来更方便。

没有痛苦。种植牙的手术规模很小, 无须住院, 手术过程完全无痛, 术后即可进食。

效果显著。咀嚼能力是种植牙优势中最为重要的一点, 能承受强大的力量, 咀嚼效率较

传统义齿有大幅度提高。

谢志胜

招聘: 前台一名, 会平面设计; 护士一名, 口腔或护理专业。

谢志胜口腔门诊地址: 金山路南段双汇大厦对面
咨询电话: 0395-2687838

牙病专家 谢志胜

河南省人工种植牙学组成员
(漯河市后谢牙防所)
地址: 金山路南段双汇大厦对面